


# 流感

监测周报

20 / 2014年

2014年第20周 总第283期

(2014年5月12日-2014年5月18日)



中国疾病预防控制中心  
病毒病预防控制所



# 目 录

## CONTENTS

|    |                 |
|----|-----------------|
| 01 | 摘要              |
| 03 | 一、暴发疫情          |
| 04 | 二、流感样病例报告       |
| 06 | 三、病原学监测         |
| 12 | 四、人感染动物源性流感病毒疫情 |
| 13 | 五、动物禽流感疫情       |
| 13 | 六、其他国家／地区流感监测情况 |

## 中国流感流行情况概要(截至 2014 年 5 月 18 日)

· 2014 年第 20 周, 我国南、北方省份流感活动均呈现较低水平流行态势。南、北方省份检测到的流感病毒较少, 以 A(H3N2) 和 B 型流感为主。

· 2013 年 10 月以来, 甲型 H1N1 流感病毒 913 株 (99.89%) 为 A/California/7/2009 的类似株, A(H3N2) 亚型流感病毒 733 株 (99.7%) 均为 A/Victoria/361/2011(H3N2) 类似株, B(Yamagata) 系 969 株 (97.98%) 为 B/Massachusetts/2/2012 类似株, B(Victoria) 系流感病毒 33 株 (84.6%) 为 B/Brisbane/60/2008 类似株。

· 2013 年 10 月以来, 耐药性监测显示, 所有甲型 H1N1 和 A(H3N2) 亚型毒株均对烷胺类药物耐药, 23 株甲型 H1N1 病毒对神经氨酸酶抑制剂奥司他韦敏感性高度降低, 1 株甲型 H1N1 病毒对神经氨酸酶抑制剂奥司他韦敏感性降低, 2 株 B 型流感病毒对神经氨酸酶抑制剂奥司他韦敏感性降低, 其他均对神经氨酸酶抑制剂敏感; 所有 A(H3N2) 亚型流感病毒均对神经氨酸酶抑制剂敏感。

## 摘 要

### 一、暴发疫情

2014 年第 20 周 (5 月 12 – 18 日), 全国 (未含港澳台地区, 下同) 报告流感样病例暴发疫情 (病例数 10 例及以上) 11 起, 经实验室检测, 其中 A(H3) 暴发疫情 4 起, B 型流感暴发疫情 4 起, 未确定疫情性质的疫情 3 起, 共报告病例 254 例, 无死亡病例。



## 二、流感样病例报告

2014年第20周, 南方省份哨点医院报告的流感样病例占门急诊病例总数百分比 (ILI%) 为3.1%, 高于前一周 (3.0%), 低于2012和2013年同期水平 (3.3%, 3.2%), 高于2010和2011年同期水平 (2.8%, 2.9%)。

2014年第20周, 北方省份哨点医院报告的ILI%为2.6%, 与前一周水平持平 (2.6%), 低于2010和2013年同期水平 (3.0%, 2.9%), 高于2011年同期水平 (2.3%), 与2012年同期水平持平 (2.6%)。

## 三、病原学监测

2014年第20周, 全国流感监测网络实验室共检测流感样病例监测标本3642份, 流感病毒阳性标本182份 (5.0%), 其中A型流感98份 (53.8%)、B型流感84份 (46.2%)。第20周, 南方省份流感检测阳性率为5.2%, 略高于前一周 (5.0%); 北方省份流感检测阳性率为3.9%, 与前一周 (3.9%) 持平。南、北方省份检测到的流感各型别/亚型的数量和所占比例具体见表1。

表1 流感样病例监测实验室检测结果

|               | 第20周      |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
|               | 南方省份      | 北方省份      | 合计        |
| 检测数           | 3046      | 596       | 3642      |
| 阳性数 (%)       | 159(5.2%) | 23(3.9%)  | 182(5.0%) |
| A 型           | 88(55.3%) | 10(43.5%) | 98(53.8%) |
| 季节性 A(H1N1)   | 0(0)      | 0(0)      | 0(0)      |
| 季节性 A(H3N2)   | 81(92.0%) | 10(100%)  | 91(92.9%) |
| 甲型(H1N1)      | 5(5.7%)   | 0(0)      | 5(5.1%)   |
| A(unsubtyped) | 2(2.3%)   | 0(0)      | 2(2.0%)   |
| B 型           | 71(44.7%) | 13(56.5%) | 84(46.2%) |
| B 未分系         | 69(97.2%) | 13(100%)  | 82(97.6%) |
| Yamagata      | 2(2.8%)   | 0(0)      | 2(2.4%)   |

2014年第20周, 国家流感中心对85株A(H3N2)亚型流感毒株进行抗原性分析, 84株为A/Victoria/361/2011(H3N2)的类似株, 1株为A/Victoria/361/2011(H3N2)的低反应株; 对46株B(Yamagata)系流感病毒进行抗原性分析, 45株为B/Massachusetts/2/2012的类似株, 1株为B/Massachusetts/2/2012的低反应株; 对8株B(Victoria)系流感毒株进行抗原性分析, 7株为B/Brisbane/60/2008的类似株, 1株为B/Brisbane/60/2008的低反应株。

2014年第20周, 国家流感中心对34株甲型H1N1、83株H3N2、46株B型流感毒株耐药性监测显示, 所有甲型H1N1、H3N2、B型流感毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感。

# 暴发疫情

## （一）本周新增报告的暴发疫情概况。

2014年第20周（5月12－18日），全国（不含港澳台地区，下同）报告流感样病例暴发疫情（病例数10例及以上）11起，经实验室检测，其中A(H3)暴发疫情4起，B型流感暴发疫情4起，未确定疫情性质的疫情3起，共报告病例254例，无死亡病例。

## （二）年度暴发疫情概况。

2014年第14－20周（2014年3月31日－5月18日），全国累计报告ILI暴发疫情（病例数10例及以上）47起，其中A(H3)暴发疫情16起，甲型H1N1流感暴发疫情2起，B型流感暴发疫情16起，未确定疫情性质的疫情13起。

### 1. 时间分布。

2014年第14－20周，南方省份共报告39起ILI暴发疫情，较2013年同期报告疫情（58起）有所减少。（图1）

2014年第14－20周，北方省份共报告8起ILI暴发疫情，较2013年同期报告疫情（3起）有所增多。（图2）

注：2014年第8周报告的1起暴发疫情为2013年5月发生的疫情；第9周报告疫情中，4起为2013年11、12月份发生的疫情。




图1 2013－2015年度南方省份报告ILI暴发疫情时间分布

（按疫情报告时间统计）




图2 2013—2015年度北方省份报告ILI暴发疫情时间分布  
(按疫情报告时间统计)

## 2. 地区分布。

2014年第14—20周，全国累计报告的47起ILI暴发疫情，分布于广东（17起），广西（7起），湖南（4起），黑龙江（4起），江苏、福建、上海、重庆（各2起），云南、安徽、西藏、河北、海南、新疆、山东（各1起）。

# 流感样病例报告

## （一）流感监测哨点医院报告情况。

截至2014年5月19日24时，全国554家国家级流感监测哨点医院有529家（95.5%）报告了2014年第20周的ILI数据。21个省份及新疆生产建设兵团的及时报告率达到100%。

表 2 2014 年第 20 周各省份报告不及时的国家级 ILI 监测哨点医院数量统计

| 省份  | 报告不及时哨点医院数量（家） | 省份  | 报告不及时哨点医院数量（家） |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 西 藏 | 10             | 广东省 | 1              |
| 内蒙古 | 4              | 河北省 | 1              |
| 四川省 | 3              | 河南省 | 1              |
| 吉林省 | 2              | 江西省 | 1              |
| 甘肃省 | 1              | 青海省 | 1              |

（二）南方省份流感样病例占门急诊病例总数百分比。

2014 年第 20 周，南方省份哨点医院报告的流感样病例占门急诊病例总数百分比（ILI%）为 3.1%，高于前一周（3.0%），低于 2012 和 2013 年同期水平（3.3%，3.2%），高于 2010 和 2011 年同期水平（2.8%，2.9%）。(图 3)




图 3 2010 — 2015 年度南方省份哨点医院报告的流感样病例 %

（三）北方省份流感样病例占门急诊病例总数百分比。

2014 年第 20 周，北方省份哨点医院报告的 ILI% 为 2.6%，与前一周水平持平（2.6%），低于 2010 和 2013 年同期水平（3.0%，2.9%），高于 2011 年同期水平（2.3%），与 2012 年同期水平持平（2.6%）。(图 4)。




图4 2010 – 2015 年度北方省份哨点医院报告的流感样病例 %

## 病原学监测

### (一)流感样病例监测。

#### 1. 全国流感病毒分离情况。

截至2014年5月19日数据下载时, 2014年第17 – 20周 (4月21日 – 5月18日) 全国各省 (市、区) 有88家网络实验室开展了病毒分离工作, 共分离到255株流感病毒 (表3)。自2013年10月1日 (2013年第40周) 以来, 国家流感中心 (CNIC) 收到各流感监测网络实验室上送的甲型H1N1、A (H3N2) 和B型流感病毒株23468株, 其中采样日期在2013年10月1日之后甲型H1N1、A (H3N2) 和B型流感病毒株22599株。(表4)

表 3 2014 年第 17 – 20 周各省份流感病毒分离情况（按采样日期统计）

| 省份  | 分离的流感<br>毒株数 | 分离的 A 型各亚型与 B 型各系毒株数 |         |            |                  |                  |
|-----|--------------|----------------------|---------|------------|------------------|------------------|
|     |              | 季节性<br>A(H1N1)       | A(H3N2) | 甲型<br>H1N1 | B(Victoria)<br>系 | B(Yamagata)<br>系 |
| 广东省 | 51           | 0                    | 26      | 10         | 0                | 15               |
| 广西省 | 48           | 0                    | 38      | 8          | 0                | 2                |
| 江苏省 | 37           | 0                    | 5       | 21         | 0                | 11               |
| 北京市 | 22           | 0                    | 13      | 1          | 0                | 8                |
| 湖南省 | 14           | 0                    | 8       | 1          | 0                | 5                |
| 福建省 | 13           | 0                    | 0       | 2          | 0                | 11               |
| 浙江省 | 12           | 0                    | 1       | 0          | 0                | 11               |
| 安徽省 | 11           | 0                    | 1       | 0          | 0                | 10               |
| 江西省 | 10           | 0                    | 2       | 0          | 0                | 8                |
| 山东省 | 7            | 0                    | 0       | 0          | 0                | 7                |
| 上海市 | 7            | 0                    | 4       | 0          | 0                | 3                |
| 云南省 | 7            | 0                    | 2       | 1          | 0                | 4                |
| 辽宁省 | 4            | 0                    | 1       | 1          | 1                | 1                |
| 新疆  | 4            | 0                    | 0       | 0          | 2                | 2                |
| 湖北省 | 3            | 0                    | 1       | 0          | 0                | 2                |
| 四川省 | 3            | 0                    | 0       | 0          | 0                | 3                |
| 天津市 | 2            | 0                    | 0       | 0          | 0                | 2                |
| 总计  | 255          | 0                    | 102     | 45         | 3                | 105              |

表 4 国家流感中心累计收检季节性流感毒株数量  
(采样日期 2013 年 10 月 1 日 – 2014 年 5 月 18 日)

| 省份  | 收检<br>次数 | 收检毒株<br>总数 | 省份  | 收检<br>次数 | 收检毒株<br>总数 | 省份   | 收检<br>次数 | 收检毒株<br>总数 |
|-----|----------|------------|-----|----------|------------|------|----------|------------|
| 安徽  | 174      | 1459       | 湖北  | 145      | 1092       | 陕西   | 62       | 553        |
| 北京  | 135      | 909        | 湖南  | 231      | 1351       | 上海   | 228      | 2172       |
| 福建  | 111      | 1024       | 吉林  | 87       | 395        | 四川   | 103      | 398        |
| 甘肃  | 49       | 363        | 江苏  | 104      | 413        | 天津   | 34       | 702        |
| 广东  | 178      | 1142       | 江西  | 184      | 1140       | 西藏   | 0        | 0          |
| 广西  | 113      | 1197       | 辽宁  | 121      | 1016       | 新疆   | 80       | 433        |
| 贵州  | 147      | 394        | 内蒙古 | 9        | 80         | 新疆兵团 | 0        | 0          |
| 海南  | 8        | 40         | 宁夏  | 14       | 118        | 云南   | 190      | 866        |
| 河北  | 37       | 514        | 青海  | 11       | 105        | 浙江   | 122      | 848        |
| 河南  | 107      | 573        | 山东  | 285      | 1651       | 重庆   | 88       | 345        |
| 黑龙江 | 128      | 994        | 山西  | 50       | 312        |      |          |            |

2. 南方省份。

2014 年第 20 周，南方省份检测到流感阳性标本 159 份（5.2%），其中 A 型流感阳性标本 88 份（55.3%），B 型阳性标本 71 份（44.7%）。88 份 A 型流感阳性标本中，81 份（92.0%）A (H3N2) 流感，5 份（5.7%）甲型 H1N1 流感，2 份（2.3%）A 未分型流感。各型别具体数据见表 1 和图 5。2014 年第 19 周，南方省份网络实验室共分离到 52 株流感病毒，21 株为 A (H3N2) 流感，10 株为甲型 H1N1 流感，21 株为 B (Yamagata) 系流感。分离的病毒型别构成见图 6。




图5 南方省份ILI标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果CNIC结果不一致的以CNIC复核结果为准。




图6 南方省份ILI标本分离毒株型别/亚型构成

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和CNIC结果不一致的以CNIC复核结果为准。

### 3. 北方省份。

2014年第20周，北方省份检测到流感病毒阳性标本23份（3.9%），其中A型流感阳性标本10份（43.5%），B型阳性标本13份（56.5%）。10份A型流感中均为A（H3N2）流感。各型别具体数据见表1和图7。2014年第19周，北方省份网络实验室分离到6株流感病毒，2株为A（H3N2）流感，1株为甲型H1N1流感，3株为B（Yamagata）系流感。分离的病毒型别构成见图8。




图 7 北方省份 ILI 标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。




图 8 北方省份 ILI 标本分离毒株型别 / 亚型构成

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。

## （二）ILI 暴发疫情实验室检测结果。

### 1. 南方省份。

2014 年第 20 周，南方省份网络实验室收检到流感样病例暴发疫情标本 80 份，检测到流感病毒阳性标本 42 份，其中 A(H3N2) 流感 20 份，B 型流感未分系 22 份。(图 9)




图9 南方省份ILI暴发疫情标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和CNIC结果不一致的以CNIC复核结果为准。

## 2. 北方省份。

2014年第20周，北方省份网络实验室收检到流感样病例暴发疫情标本20份，检测到流感病毒阳性标本14份，其中A(H3N2)流感9份，B型流感未分系5份。(图10)




图10 北方省份ILI暴发疫情标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和CNIC结果不一致的以CNIC复核结果为准。

### （三）抗原性和基因特性分析。

2014年第20周,国家流感中心对85株A(H3N2)亚型流感毒株进行抗原性分析,84株为A/Victoria/361/2011(H3N2)的类似株,1株为A/Victoria/361/2011(H3N2)的低反应株;对46株B(Yamagata)系流感病毒进行抗原性分析,45株为B/Massachusetts/2/2012的类似株,1株为B/Massachusetts/2/2012的低反应株;对8株B(Victoria)系流感毒株进行抗原性分析,7株为B/Brisbane/60/2008的类似株,1株为B/Brisbane/60/2008的低反应株。

2013年10月1日—2014年5月18日(以采样日期统计),CNIC对914株甲型H1N1流感病毒进行抗原性分析,其中913株(99.89%)为A/California/7/2009的类似株,1株(0.11%)为A/California/7/2009的低反应株;对同期的735株A(H3N2)亚型流感毒株进行抗原性分析,733株(99.7%)为A/Victoria/361/2011(H3N2)的类似株,2株(0.3%)为A/Victoria/361/2011(H3N2)的低反应株;对同期的989株B(Yamagata)系流感病毒进行抗原性分析,其中969株(97.98%)为B/Massachusetts/2/2012的类似株,20株(2.02%)为B/Massachusetts/2/2012的低反应株;对同期的39株B(Victoria)系流感毒株进行抗原性分析,33株(84.6%)为B/Brisbane/60/2008的类似株,6株(15.4%)为B/Brisbane/60/2008的低反应株。

### （四）耐药性分析。

2014年第20周,国家流感中心对34株甲型H1N1、83株A(H3N2)、46株B型流感毒株耐药性监测显示,所有甲型H1N1、A(H3N2)、B型流感毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感。

2013年10月1日—2014年5月18日,CNIC耐药监测数据显示,所有甲型H1N1和A(H3N2)亚型毒株均对烷胺类药物耐药;23株甲型H1N1病毒对神经氨酸酶抑制剂奥司他韦敏感性高度降低,1株甲型H1N1病毒对神经氨酸酶抑制剂奥司他韦敏感性降低,2株B型流感病毒对神经氨酸酶抑制剂奥司他韦敏感性降低,其他均对神经氨酸酶抑制剂敏感。所有A(H3N2)亚型流感病毒均对神经氨酸酶抑制剂敏感。



# 人感染动物源性流感病毒疫情

## (一) 人感染 H7N9 禽流感病毒疫情。

根据传染病报告信息管理系统数据,2014年5月13—19日我国内地报告人感染 H7N9 禽流感确诊病例5例,无死亡病例。5例病例分别来自广东(3例)、安徽、江苏(各1例)。2014年1月1日—5月19日,我国内地累计报告人感染 H7N9 确诊病例283例,死亡病例109例。

截止2014年5月19日,我国累计报 H7N9 确诊病例439例,死亡病例161例(含香港10例,死亡3例、台湾2例,死亡1例)。

表 5 我国内地报告人感染 H7N9 禽流感确诊病例情况

| 省份* | 确诊病例数 | 死亡病例数 | 病死率(%) | 性别  |    | 年龄范围<br>(中位数) |
|-----|-------|-------|--------|-----|----|---------------|
|     |       |       |        | 男   | 女  |               |
| 安徽  | 12    | 9     | 75     | 11  | 1  | 14-85 (61.5)  |
| 北京  | 2     | 1     | 50     | 2   | 0  | 57-73 (65)    |
| 福建  | 17    | 5     | 29.41  | 14  | 3  | 2-80 (45)     |
| 广东  | 103   | 34    | 33.01  | 64  | 39 | 2-88 (57)     |
| 广西  | 2     | 1     | 50     | 1   | 1  | 5-55 (30)     |
| 湖南  | 21    | 7     | 33.33  | 14  | 7  | 8-78 (43.5)   |
| 吉林  | 2     | 0     | 0      | 2   | 0  | 49-63 (56)    |
| 江苏  | 25    | 7     | 28     | 19  | 6  | 35-82 (53.5)  |
| 上海  | 8     | 7     | 87.5   | 6   | 2  | 30-86 (57.5)  |
| 江西  | 2     | 0     | 0      | 1   | 1  | 23-75 (49)    |
| 浙江  | 88    | 37    | 42.05  | 59  | 29 | 1-84 (59)     |
| 山东  | 1     | 1     | 100    | 1   | 0  | 58            |
| 总计  | 283   | 109   | 38.52  | 194 | 89 | 2-88 (57)     |

\*: 按现住址统计。

## (二) 人感染 H5N1 高致病性禽流感病毒疫情。

第20周, WHO未报告人感染 H5N1 高致病性禽流感病例。

(译自: [http://www.who.int/influenza/human\\_animal\\_interface/en/](http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/en/))



## 动物禽流感疫情

第20周, OIE未报告高致病性禽流感动物疫情。

(译自: [http://www.oie.int/wahis\\_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI](http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI))

## 其他国家 / 地区流感 监测情况

美国 (第 19 周, 2014 年 5 月 4 – 10 日)

第 19 周, 流感样病例门诊监测网络报告的 ILI% 为 1.3%, 低于国家基线 (2.0%)。




图 11 美国流感样病例监测周分布




图 12 美国流感病原监测周分布

第19周, 122个城市报告死于肺炎和流感的死亡人数占全部死亡人数的6.2%, 低于流行阈值6.9%。




图 13 美国肺炎和流感死亡监测

注：美国共有 10 个监测地区。

(译自：<http://www.cdc.gov/flu/weekly/pastreports.htm>)

### 加拿大（第 19 周，2014 年 5 月 4 – 10 日）

第 19 周，加拿大 B 型流感继续在几个地区流行，但整体水平保持稳定或已经下降。B 型流感高峰已经过去，流感流行水平仍在预期范围内。过去四周，A 型流感稳步下降。

第 19 周，检测到的流感阳性样本数从第 18 周的 445 份下降至 401 份（流感检测阳性率为 11.0%）。B 型流感为主要流行株，占流感病毒检测中的 92%。




图 14 加拿大流感病原监测周分布

2013 – 2014 监测年度，加拿大国家微生物实验室对 2039 株流感病毒（112 株 A(H3N2），1366 株甲型 H1N1 流感，561 株 B 型）进行了抗原性检测，其中绝大多数病毒（99%）与 WHO 推荐的 2013 – 2014 年度季节性流感疫苗株类似，2 株甲型 H1N1 流感病毒对 A/California/07/2009 抗血清反应降低，26 株 B 型与 WHO 推荐的 2011 – 2012 年度季节性流感疫苗株类似。



ILI 就诊率与上周类似 20.2‰，略高于预期范围。




图 15 加拿大流感样病例监测周分布

注：加拿大共有 10 个省和 3 个特区，分为 54 个监测地区。

(译自: <http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch>)

## 欧洲（第 19 周，2014 年 5 月 5 – 11 日）

欧洲大部分地区 ILI 和 ARI 就诊率接近非流行季水平。近几周，哨点医院 ILI、ARI 和 SARI 病例和病例中流感病毒阳性率均较低。自 2013 年第 40 周开始，A 型流感病毒一直为主要流行株。

哨点及非哨点医疗机构共采集 5097 份标本，354 (7%) 检测结果为流感阳性：其中 224 份 (63%) 为 A 型，130 (37%) 为 B 型。




图 16 欧洲检测流感阳性标本统计

(译自: <http://www.euroflu.org/index.php>)

## 香港（第 19 周，2014 年 5 月 4 – 10 日）

整体流感活动已回复至基线水平，显示本冬季流感季节已经结束。

第 19 周，香港定点普通科诊所报告的流感样病例个案平均数为 3.1‰。




图 17 香港定点普通科诊所流感样病例监测周分布

第 19 周，香港定点私家医生所报告的流感样病例个案平均数为 41.8%。




图 18 香港定点私家医生流感样病例监测周分布

第 19 周，香港公共卫生检测中心共检测到 98 份流感病毒阳性标本，其中包括 2 份甲型 H1N1，29 份 A (H3) 和 62 份 B 型流感。




图 19 香港流感病原监测周分布

2014年第19周, 共报告4起发生在学校/院舍的流感样病例暴发疫情。2014年第20周的前4天(2014年5月11-14日)报告1起发生在学校/院舍的流感样病例暴发。0-4岁、5-64岁和65岁及以上年龄组主要诊断为流感的入院率分别为0.12、0.03和0.18人(此年龄组别每1万人的人口)。

(摘自: [http://www.chp.gov.hk/tc/guideline1\\_year/29/134/441/304.html](http://www.chp.gov.hk/tc/guideline1_year/29/134/441/304.html))

### 台湾地区 (第 19 周, 2014 年 5 月 4 - 10 日)

台湾流感疫情即将脱离高峰期, 目前社区流感病毒以B型为主。

2014年第17周流感病毒阳性率为16.8%, 阳性标本中74.3%为B型流感病毒。




图 20 台湾地区 2012 - 2014 流感病毒分型

2014年第19周新增32例流感并发症病例，无新增流感相关死亡病例。自2013年7月1日起，共1728例流感并发症病例，共594例流感并发症病例需加设病房治疗；146例流感并发症死亡病例。

2014年第19周，门诊流感样病例就诊人数为58230，门急诊就诊百分比均呈下降趋势。




图 21 台湾地区门诊及急诊流感样病例百分比

(摘自: <http://flu.cdc.gov.tw/>)







## 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所编制

---

地 址：北京市昌平区昌百路155号病毒病所

邮 编：102206

电 话：010—58900863

传 真：010—58900863

电子邮箱：Fluchina@cnic.org.cn

编 辑：中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所国家流感中心

编发日期：2014年5月22日

发行范围：国家卫生计生委领导、疾病预防控制局、卫生应急办公室、  
医政司；中国疾病预防控制中心领导、病毒病所、各相关处室；

下 载：中国流感监测信息系统（<http://1.202.129.170:82/>）或  
中国国家流感中心网站（<http://www.cnic.org.cn/>）提供下载。